

**媒体联络人：**

Christa Hyson, MPH  
Senior Manager, External Relations  
(513) 247-5254

立即发布

**COVID-19 检测和隔离的更新指示**  
**俄亥俄州卫生署 (Ohio Department of Health) 发布**

为确保检测工作更具针对性，疾病控制和预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 建议医务人员首先评估出现 COVID-19 疑似症状（咳嗽、发烧、呼吸急促）的患者，并优先对重症和并发症高风险人群展开检测。

**优先人群包括：**

- 具有 COVID-19 感染相关体征和症状的住院患者，目的是做出感染防控相关决策。
- 其他有症状个人，例如老年人、慢性病患者和/或感染风险更高的免疫功能不全者

其他流行病学因素亦可能有助于做出 COVID-19 检测的决策。妥善记录相关 COVID-19 感染情况，并掌握社区传染情况，有助于展开流行病学风险评估，以做出合理的检测决策。强烈建议医务人员对其他呼吸道疾病（例如流感）展开检测。

轻症患者建议待在家中（自我隔离），并致电其医疗健康提供者以寻求治疗管理指示。出现呼吸困难等严重症状的患者应立即就医。存在基础病或免疫功能不全的老龄患者和个人即使只出现轻微症状，也应尽早就医。

俄亥俄州卫生署与社区合作伙伴携手制定了关于 COVID-19 疑似感染者的分级检测策略：

检测级别	说明
1 级	医院及其他医疗健康机构（包括长期照护机构）内出现 COVID-19 疑似症状的住院患者
2 级	出现相关症状的 1 级机构医务人员，以及从事公共安全职业的所有个人
3 级	高风险轻中症个人，例如老年人以及有严重基础病患者
4 级	有轻中症，但无其他风险因素会导致出现不良后果的个人 - <b>目前不建议进行检测</b>
5 级	无症状个人 - <b>目前不建议进行检测</b>

**终止隔离预防的条件**

针对 COVID-19 确诊或疑似患者，CDC 已发布[终止居家隔离](#)的不检测条件和[医务人员复工条件](#)。不检测策略包括：

- 自康复（未使用退烧药而不再持续发烧）并且呼吸道症状（例如咳嗽、呼吸急促）有所缓解以来，已至少超过 3 天（72 小时）；以及，
- 自首次出现症状以来，已至少超过 7 天。

如需了解更多信息，请访问 <https://healthcollab.org/covid-19/>

**###**

**关于卫生合作组织 (The Health Collaborative):** 卫生合作组织是一个非营利性组织，旨在推进各种数据驱动的措施，以此提升人们的健康水平和医疗护理水平，并降低成本。如需了解有关卫生合作组织的更多信息，请访问 [healthcollab.org](http://healthcollab.org)。

